



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

AVVISO PUBBLICO N. 62385 DEL 19.04.2024, PER TITOLI ED EVENTUALE PROVA SELETTIVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI DI PEDIATRIA, A TEMPO DETERMINATO.

1. Viene condotto in PS un bambino di 2 mesi con rinite da qualche giorno, difficoltà respiratoria e alimentazione ridotta. Cosa fare?
2. Un bambino di 3 anni presenta numerose scariche diarroiche liquide e vomito; non riesce ad alimentarsi e ha l'alito francamente acetone-mico. Come procedi?
3. Un bambino di 8 mesi giunge in PS per pianto. Alla visita la mobilitazione dell'arto inferiore destro evoca pianto importante. La coscia sembra di dimensioni aumentare rispetto alla controlaterale, Come procedere
4. Lattante di 5 settimane, colorito grigiastro, non si alimenta per os, TC 36°C. Giunge in PS alle 2.00 del mattino. Genitori indiani non parlano italiano come procedere.
5. Sala parto. Ore 4.00. Parto 40° settimana per via vaginale. Liquido marcatamente tinto di meconio. Il neonato nasce, iporeattivo, apnoico, FC 80 b/min. Rianimazione secondo protocollo. Al 10 min il neonato è sempre iporeattivo, respiro irregolare, emogas capillare pH 6.9, pCO₂ 90, pO₂ 35, BE – 15. Lattati 9. Come procedere?
6. Bambino di 1 anno, appena arrivato dal Ghana coi genitori adottivi. Preoccupati lo portano in PS perché preoccupati da caviglie, piedi e palpebre gonfie. Descrivi il tuo approccio.
7. Neonato "late preterm" (34 settimane di gestazione), nato da taglio cesareo urgente indicato dalla gestosi materna refrattaria alla terapia, profilassi steroidea per la maturazione polmonare parziale. In terza giornata di vita, nel corso di svezzamento da CPAP e FiO₂ 26% per distress respiratorio moderato, assisti a desaturazione rapida a 74% con FC 178/min. Descrivi il tuo approccio.
8. Gestione del neonato asfittico
9. Bambino di 4 anni con LLA con febbre a 39°C, è in chemioterapia in fase di induzione. Come ti comporti?

10. Un ragazzino di 12 anni presenta astenia, calo ponderale e diarrea muco ematica da 2 giorni. I genitori sono molto preoccupati poiché la madre ha un morbo di Chron. Come procedi?
11. Un bambino di 5 anni affetto da drepanocitosi si viene condotto in PS per dolore osseo. Come procedi?
12. Un bambino di 5 anni viene condotto in PS PED per alterazione dello stato di coscienza, febbre a 39°C e cefalea frontale. Come ti comporti?
13. Un neonato figlio di madre diabetica nasce da cesareo per alterazione del tracciato CTG dopo induzione; PN: Kg 4,450 , Apgar 7, 9 , 9. Dopo 2 ore dalla nascita presenta distress respiratorio ingravescente. Come procedi?
14. Arriva in PS PED un bambino di 5 anni con edema alle caviglie e periorbitario. Come procedi?
15. Neonato a termine, nato da parto vaginale spontaneo. Tampone materno positivo per Streptococco B e profilassi materna incompleta. Il neonato appare iporeattivo e con colorito grigio pallido. Come procedi?
16. Bambino di 12 mesi con irritabilità alternata a sopore, difficoltà di alimentazione e crisi di pianto inconsolabile. Non febbre, non scarica da 2 giorni. Come procedi?
17. Bambino di 5 anni con pregressa virosi respiratoria una settimana prima. Si presenta in PS PED per polipnea, lieve dispnea, dolore toracico e difficoltà a mantenere la posizione supina. Cosa fare?
18. Bambino di 6 anni con macroematuria senza altri sintomi. Come procedi?
19. Bambino di 3 anni con tumefazione laterocervicale destra di circa 4 cm, è febbrile con puntate a 39°C. Come procedi?
20. Bambino di 12 anni con dolore testicolare acuto. Come procedi?
21. Bambino di 6 anni con febbre e zoppia destra. Come procedi?

RISULTATI PROVA ORALE

ID DOMANDA	PUNTI	ESITO
4315257	19,000	Superata
4299370	19,000	Superata
4304832	20,000	Superata
4314954	19,000	Superata
4304966	19,000	Superata
4299457	20,000	Superata
4296797	19,000	Superata
4304021	19,000	Superata
4288980	19,000	Superata
4297116	19,000	Superata
4297161	19,000	Superata
4285591	19,000	Superata