

CONCORSO PUBBLICO N. 63649 DEL 02.05.2023, PER TITOLI ED ESAMI, A N.

1 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA

PROVA SCRITTA

Tempo a disposizione: minuti 45 (quarantacinque)

Prova scritta n. 1 (ESTRATTA)

1. DEFINIZIONE E GESTIONE DELLA CHETOACIDOSI DIABETICA
2. CAUSE E GESTIONE DELL'IPERTENSIONE ENDOCRANICA IN ETÀ NEONATALE E PEDIATRICA

Prova scritta n. 2

1. CAUSE E GESTIONE DELL'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DEL LATTANTE
2. CAUSE E GESTIONE DELLA SEPSI NEONATALE E DEL LATTANTE

Prova scritta n. 3

1. CAUSE DI CIANOSI DEL NEONATO E STABILIZZAZIONE CLINICA
2. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI ARTRITE IN ETÀ PEDIATRICA

La Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione per la prova scritta.

- Criteri di "premio":

- Corretto inquadramento scientifico;
- Completezza negli elementi fondamentali;
- Aggiornamento sulle tecniche diagnostiche e terapeutiche.

PROVA PRATICA

Tempo a disposizione: minuti 15 (quindici)

Prova pratica n. 1

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA DIARREA CRONICA

Prova pratica n. 2 (ESTRATTA)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DEL DOLORE ADDOMINALE ACUTO DEL LATTANTE

Prova pratica n. 3

TRATTAMENTO DELLE CRISI DOLOROSE DELL'ANEMIA FALCIFORME

Vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione delle prove pratiche:

- Criteri di "premio":

- adeguato inquadramento del caso clinico proposto;
- proprietà di linguaggio e capacità di sintesi.

QUESITI PROVA ORALE

Viene portato in PS un lattante di 3 mesi per ipoalimentazione febbricola e respiro frequente con dispnea lieve-moderata. Approccio clinico-diagnostico e terapia

Giunge in PS accompagnato dal 118 un bambino di 7 aa per crisi convulsiva in apiressia. Ti hanno avvisato telefonicamente dell'arrivo. Che informazioni chiedi all'auto medica e cosa prepari in PS prima dell'arrivo

Arriva in pronto soccorso un bambino di 1 anno con febbre a 39°C da 48 ore e nessun altro sintomo. Cosa fare?

Arriva in pronto soccorso un bambino di 2 anni che presumibilmente ha ingerito una disk battery. Cosa fare?

Un bambino di 4 mesi ha avuto 4 scariche diarroiche e 2 vomiti nelle ultime 12 ore. La mamma riferisce che è stato pesato 4 giorni prima e che il suo peso era di 5.5 kg. Ha 37.5° C di temperatura. Cosa fare?

Un bambino di 3 anni arriva in pronto soccorso per un espirio con sibilo che ha sentito la mamma nelle ultime ore. Il bambino è in buone condizioni generali ma ha una dispnea lieve. Non ha febbre. Cosa fare?

Un bambino con drepanocitosi arriva in pronto soccorso con febbre a 39° C e dolore toracico. Cosa fare

Un bambino nasce a termine da parto spontaneo. I A 7;7;8. Presenta cianosi centrale e saturazione transcutanea di 80% agli arti superiori e inferiori. Cosa fare

Un bambino di 6 mesi di età viene in pronto soccorso perché i genitori lo vedono più stanco da 2 giorni, con un respiro più frequente e più irritabile. Si alimenta a fatica nelle ultime 48 ore Cosa fare

Arriva alla tua attenzione un bambino di 4 anni con edema improntabile alle caviglie. Cosa fare?

Arriva alla tua attenzione un bambino di 13 anni per ematuria. Diagnosi differenziale

Arriva alla tua attenzione un bambino di 3 anni con febbre e tumefazione al ginocchio di destra. Cosa fare?

Arriva alla tua attenzione un bambino di 15 mesi con febbre a 38.5 ° C, ipoalimentazione e irritabilità. Condizioni scadute, iporeattivo. Genitori No Vax.

Viene portata alla vostra attenzione una ragazza di 15 anni con astenia, febbricola serotina ed alvo caratterizzato da feci con muco. Cosa fare?

Arriva alla tua attenzione un lattante di 3 mesi con ipoalimentazione, irritabilità da 4 giorni. Ha la sindrome di Down Non ha febbre e all'auscultazione viene riscontrata una frequenza cardiaca di 200 battiti al minuto. Cosa fare?

Una bambina di 10 anni si presenta in pronto soccorso per calo del visus e alterazione del tono dell'umore e febbre. Cosa fare?

Un bambino di 4 anni viene portato in PS per una marcia atassica che i genitori hanno osservato da circa una settimana. Un episodio di vomito. Non dolori addominali o febbre. Cosa fare

Bambina di 4 anni arriva alla tua attenzione per febbre elevata da 2 giorni > 39 ° C, iperemia congiuntivale, mucosite orofaringea che limita l'alimentazione, Tosse e iniziale rash maculopapulare al volto e tronco. Cosa fare. Genitori non Vax

Bambino di 3 anni arriva in PS alle ore 24 per uno stridore inspiratorio accompagnato da febbre a 38. Genitori no vax Cosa fare

Bambino di 10 mesi presenta irritabilità alternata a sopore, difficoltà di alimentazione e crisi di pianto inconsolabile. Non febbre. Non scarica da 2 giorni. Cosa fare.