

PERCHÉ È PERICOLOSO?

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è particolarmente pericoloso per tutti i neonati e i bambini piccoli e fragili sotto i due anni di vita.

Il VRS può causare:



Bronchiolite



Polmonite



Complicazioni come infezioni dell'orecchio medio



Maggior rischio di sviluppare asma negli anni successivi

In taluni casi può essere necessario il ricovero in ospedale, in pediatria o in terapia intensiva neonatale.

Per questi motivi, è molto importante prendere precauzioni per prevenire l'infezione da VRS.

Per maggiori informazioni, parlane con il Pediatra di Libera Scelta o informati presso i servizi di vaccinazioni pediatriche o l'ospedale di riferimento.



Inquadra il QR CODE per i contatti dei centri vaccinali territoriali.

Per approfondimenti:

www.ministerosalute.it


www.ecdc.europa.eu

www.cdc.gov

www.who.int

www.regione.fvg.it

www.msdmanuals.com



UN RESPIRO SERENO

PREVENZIONE DELLA BRONCHIOLITE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (VRS) NEI BAMBINI

PREVENZIONE DELLA BRONCHIOLITE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCINZIALE (VRS) NEI BAMBINI



SINTOMI

I sintomi dell'infezione da VRS inizialmente sono simili a quelli di un raffreddore e possono manifestarsi con:

- tosse
- starnuti
- naso chiuso
- febbre
- difficoltà respiratoria
- apnea (cessazione temporanea della respirazione)
- irritabilità
- difficoltà di alimentazione

PREVENZIONE

Per prevenire il contagio è essenziale lavarsi spesso e accuratamente le mani.

Le persone con sintomi respiratori, soprattutto se bambini in età scolare, non dovrebbero stare a stretto contatto con i bambini più piccoli, in particolare con i neonati, fino alla risoluzione dei sintomi.

IMMUNIZZAZIONE

Per la stagione 2024/2025 la Regione Friuli Venezia Giulia offrirà gratuitamente a tutti i neonati l'immunizzazione con anticorpo specifico (Nirsevimab) contro il virus respiratorio sinciziale prima della dimissione dai punti nascita in un'unica somministrazione intramuscolo.

L'immunizzazione sarà offerta gratuitamente anche a tutti i bambini fino ai 6 mesi di età e a quelli tra 6 e 24 mesi con fattori di rischio. Parlane con il Pediatra di Libera Scelta o informati presso i servizi di vaccinazioni pediatriche o l'ospedale di riferimento.