

Per la prenotazione di controlli ortopedici, cicli di infiltrazione e medicazioni presso gli ambulatori ortopedici si possono utilizzare le seguenti opzioni:

- Presso l'accettazione degli ambulatori ortopedici dalle ore 8.00 alle 14.30, dal lunedì al venerdì, padiglione 1 piano interrato
- Telefonando al numero 0432 554031 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00
- Inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
appuntamenti.ortopedia@asufc.sanita.fv.g.it indicando nominativo, numero di telefono e prestazione richiesta. Verrete ricontattati appena possibile.



CONTATTI STRUTTURA

Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia - Udine

P. le Santa Maria della Misericordia, 15
33100 Udine

SOC ORTOPEDIA E TRUMATOLOGIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA

Segreteria e ambulatori ortopedici

Padiglione 1 - Piano seminterrato

Orari dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Telefono: 0432 554031

Pronto Soccorso Ortopedico

Padiglione 1 - Piano terra

Reparto

Padiglione 15 Nuovo ospedale - secondo piano

Telefono: 0432 552776

Segreteria della SOC Ortopedia e Traumatologia S. Maria della Misericordia

Padiglione 15 Nuovo ospedale - secondo piano

Telefono: 0432 552771

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Sede legale: Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine

Pec: asufc@certsanita.fvg.it

Sito web: www.asufc.sanita.fvg.it

Azienda Sanitaria Informa: +39 0432 554440


Centralino: + 39 0432 5521

 ASU FC Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE

STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
S. MARIA DELLA MISERICORDIA

SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PER FRATTURE DI CLAVICOLA E LUSSAZIONI ACROMIONCLAVEARI



TIRANTE A OTTO PER FRATTURE DI CLAVICOLA



A cosa serve?

A riallineare e mantenere allineate le fratture di clavicola.

Com'è fatto?

E' un presidio formato da cinghie adattabili e velcri di bloccaggio.

Per quanto tempo va tenuto?

In base alle indicazioni mediche, tendenzialmente per circa 30 giorni.

Indicazioni particolari

- Mantenere il bendaggio a pelle per tutta la durata del trattamento.
- Se presenza di formicolio, edema e cianosi alle dita fare in modo di detendere il bendaggio, mettendosi supini oppure, in posizione seduta o eretta sollevare i gomiti fino all'altezza delle spalle.
- Controllare con attenzione che a livello del cavo ascellare non si formino lesioni da decubito.
- Si sottolinea la necessità di NON rimuovere il bendaggio per tutta la durata del trattamento, salvo diversa necessità/indicazione medica

TUTORE PER LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE



A cosa serve?

Serve a ridurre le lussazioni acromion-claveari/fratture claveari

Com'è fatto?

E' un presidio formato da una tasca reggibraccio e una serie di cinghie regolabili e velcri di bloccaggio.

Per quanto tempo va tenuto?

In base alle indicazioni mediche tendenzialmente 21-28 giorni

Indicazioni particolari

- Mantenere il bendaggio a pelle per tutta la durata del trattamento.
- Si sottolinea la necessità di NON rimuovere il bendaggio per tutta la durata del trattamento, salvo diversa necessità/indicazione medica

COSA FARE?

- Muovere attivamente mano e polso
- Mantenere il tutore il più pulito possibile
- Controllare motilità e sensibilità delle dita
- Rimuovere e non riposizionare lo smalto per unghie
- Rimuovere e non riposizionare anelli
- Controllare il colorito del letto ungueale che non deve essere nero/bluastro
- Controllare eventuali bruciori (possibile formazione di lesioni)
- In presenza di altro trauma si renderà necessaria ulteriore valutazione presso Pronto Soccorso Generale

COSA NON FARE?

- Non bagnare il tutore
- Non modificare in nessun caso il tutore spontaneamente
- Ridurre le attività fisiche non indispensabili per evitare di sudare e di sviluppare quindi macerazioni cutanee
- Non portare pesi

QUANDO RECARSI IN PRONTO

SOCCORSO GENERALE?

In caso di formicolio, colorito nerastro e gonfiore delle dita non reversibili con arto in scarico, cedimento del tutore, tutore bagnato, bruciore cutaneo nelle parti coperte dal tutore.

QUANDO RECARSI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE?

In caso di dolore o di presenza di ecchimosi cutanee su arto superiore o fianco